

TOXOPLASMOSIS

Ditulis oleh Esti Nugraheny S. S. T

Minggu, 08 Maret 2009 12:52 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 03 Juni 2011 13:28

Penyebab : *Toxoplasma gondii*. Habitat *T. Gondii*: anjing, kucing, tikus, burung, ayam, kerbau, sapi, babi, domba atau kambing. Penyakit ini dapat ditularkan kepada manusia. Manusia dapat terkena infeksi jika menelan ookista yang mencemari makanan atau dengan cara lain.

Gejala : nyeri pada kelenjar limfe yang membesar, dapat disertai pneumonia, polimiositis dan miokarditis, serta limfangitis. Jalannya penyakit akut atau menahun.

Cara penularan :

1. Daging mentah / kurang matang (kista)
2. Buah/ sayur mentah yg tidak dicuci bersih (ookista)
3. Kontak dengan benda yang tercemar (ookista)
4. Janin terinfeksi dari ibu (kista)

Hewan kucing merupakan tempat utama bagi kuman *Toxo* berkembang biak, sementara di tubuh hewan lain dan manusia hanya merupakan tempat perantara saja. Seekor kucing dapat menghasilkan 10 juta kuman *Toxo* setiap hari selama 2 minggu. Kuman ini dapat hidup lebih dari satu tahun di tanah atau tempat yang lembab, akan tetapi mudah mati jika disiram dengan air mendidih.

TOXOPLASMOSIS

Ditulis oleh Esti Nugraheny S. S. T

Minggu, 08 Maret 2009 12:52 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 03 Juni 2011 13:28



tinypic

This image is no longer available.
Visit tinypic.com for more information.

~~Text that is completely illegible due to heavy black redaction marks.~~



tinypic

This image is no longer available.
Visit tinypic.com for more information.

~~Text that is completely illegible due to heavy black redaction marks.~~