

TOXOPLASMOSIS

Ditulis oleh Esti Nugraheny S. S. T

Minggu, 08 Maret 2009 19:52 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 03 Juni 2011 20:28

Penyebab : *Toxoplasma gondii*. Habitat *T. Gondii*: anjing, kucing, tikus, burung, ayam, kerbau, sapi, babi, domba atau kambing. Penyakit ini dapat ditularkan kepada manusia. Manusia dapat terkena infeksi jika menelan ookista yang mencemari makanan atau dengan cara lain.

Gejala : nyeri pada kelenjar limfe yang membesar, dapat disertai pneumonia, polimiositis dan miokarditis, serta limfangitis. Jalannya penyakit akut atau menahun.

Cara penularan :

1. Daging mentah / kurang matang (kista)
2. Buah/ sayur mentah yg tidak dicuci bersih (ookista)
3. Kontak dengan benda yang tercemar (ookista)
4. Janin terinfeksi dari ibu (kista)

Hewan kucing merupakan tempat utama bagi kuman *Toxo* berkembang biak, sementara di tubuh hewan lain dan manusia hanya merupakan tempat perantara saja. Seekor kucing dapat menghasilkan 10 juta kuman *Toxo* setiap hari selama 2 minggu. Kuman ini dapat hidup lebih dari satu tahun di tanah atau tempat yang lembab, akan tetapi mudah mati jika disiram dengan air mendidih.

TOXOPLASMOSIS

Ditulis oleh Esti nugraheny S. S. T

Minggu, 08 Maret 2009 19:52 - Terakhir Diperbaharui Jumat, 03 Juni 2011 20:28



Penyakit ini dapat ditularkan jika seseorang memakan daging babi yang terinfeksi atau sayuran yang tidak dimasak dengan matang.



Gejala yang timbul pada ibu hamil yang terinfeksi Toxoplasma gondii dapat bervariasi, mulai dari tidak ada gejala hingga keguguran.